

農作物特報

魚津市
魚津市農業技術者協議会

コシヒカリの生育は近年よりやや早く、茎数も十分確保されています。

中干しが不十分で軟らかいほ場では、歩くと足跡が浅くつく程度まで、しっかり干し固めましょう。

◆コシヒカリの生育状況（6月18日現在：魚津市生育調査ほ6カ所平均）

年度	草丈 (cm)	茎数(本)		葉齡	葉色
		株当たり	m ² 当たり		
R6年	40.8	22.9	477	9.6	4.5
近 年 (6/17 時点)	42.0	23.0	461	9.0	4.0

※目標穗数：400本/m²

1. 中干し後の水管理

中干しが終わった後は、幼穂形成期頃（近年：7月10日頃）まで「間断かん水」を行い、根に水分と酸素を十分に補給し、稲体の活力維持に努めましょう。2日以上のため水は厳禁です


◆間断かん水の目安：1日湛水、2~3日落水。湛水時はしっかりと！

コシヒカリで、茎数が多く葉色が濃い場合や、中干しが不十分な場合は、落水期間を長くし、やや強めに干しましょう。

（注）肥料を施用する場合は、湛水後に施用し、その後1日で落水せず自然減水してから間断かん水に移ってください。

◆高温・少雨時は、定期的に入水する等 乾き過ぎに注意し、地温を下げ出穂の早期化を防止しましょう

コシヒカリの水管理のイメージ



※熱中症予防のため、こまめな水分補給を行い 体調管理に注意しましょう。

2. 雜草・病害虫の隨時防除

○雑草が残っている場合は、後期除草剤を散布しましょう。

適用雑草	除草剤名	散布量	散布時期	注意事項
ノビエ	トドメMF 1キロ粒剤	1kg /10a	田植後14日～ ノビエ5葉期まで ＊収穫50日前まで	5cm程度の深水にして散布し、その後7日間は止水管理・自然減水とする。落水やかけ流しをしない。
広葉雑草	バサグラン 粒剤	3～ 4kg /10a	田植後15～55日まで (クログワイは草丈 15cm以下まで) ＊収穫60日前まで	落水して雑草を露出させ、晴天日を選んで散布する。散布後3～4日間は入水・落水しない。イネ科雑草には効果がない。

○いもち病の発生がみられたら、早めに防除しましょう。

水田に残っている補植苗は直ちに処分しましょう。

3. カメムシ対策

本年は高温で経過しており、斑点米カメムシ類が多い状況です。発生密度を下げるため、畦畔や雑草地の草刈りを行いましょう。

また、一斉草刈りの後は、できるだけ雑草の穂が出ないように管理しましょう。

草刈り運動期間 6月28日(金)～7月7日(日)

一斉草刈り日 6月29日(土)・30日(日)

*刈り取った草は、用水に流さないで下さい。

*草刈り時は保護具を着用し、農作業安全に十分注意して下さい。

*草刈り時は周辺の人や車などにも十分注意して下さい。



4. てんたかく81の穂肥

A 肥効調節型基肥肥料による栽培の場合

基本的に追肥は不要ですが、現在の葉色が4.0(砂壌土 4.2)よりも濃い場合は、直ちに追肥3号で7kg/10a程度の追肥を行なって下さい。

B 分施体系の場合

1回目(出穂25日前)			2回目(出穂15日前)		
時期(目安)	幼穂長	葉色	肥料名・量	時 期	肥料名・量
6/25頃～	1～2mm	4.2	追肥3号 8～10kg/10a	1回目から 10日後	追肥3号 10～13kg/10a

※1回目の穂肥施用前に葉色が4.2以下となる場合は、3日程度早めに施用して下さい。

【幼穂確認の方法】

ほ場内で、平均的な生育の株の最も長い茎を根元から抜き取り、図の要領で確認して下さい。

